

Федеральное агентство по образованию
Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Архангельский государственный технический университет

Отчет по научному исследованию на тему:

**Фауна наземных позвоночных животных Соянского государственного
природного биологического заказника**

Исполнители: **Феклисов П.А.**, доктор
сельскохозяйств. наук, профессор;

Амосов П.Н., канд. биол. наук, доцент

Архангельск - 2007

Время исследований: 8 – 16 августа 2007 г.

Место исследований. Исследования проведены в пределах территории Соянского государственного биологического заказника. Он расположен на территории Приморского и Мезенского районов Архангельской области.

Маршрутными исследованиями для выяснения состава фауны наземных позвоночных животных были охвачены следующие участки:

- 71 км автодороги Архангельск – Поморье – пос. Кепино (автотранспортом)
- Пос. Кепино – озеро Нижнее Пачозеро по р. Котуге (лодочный и пешеходный)
- По р. Сояне от Кепино до урочища Ивгора (лодочный)
- От егерского кордона на Сояне (Пережат) до оз. Турецкого и его окрестности (пешеходный)
- Место впадения в Сояну р. Большая Турья (пеш.)
- Урочище Ивгора – ручей Становой (пешеходный)
- Урочище Ивгора – р. Малая Летопада (пешеходн.)
- Пос. Кепино – 8 квартал Кепинского лесничества (геодезическая вышка) (пеш.)

В настоящем отчете разделы «Отряд Гусеобразные» и «Отряд Курообразные» (Класс Птицы) и «Класс Млекопитающие» написаны П.А. Феклистовым, виды классов земноводных и пресмыкающихся, остальных отрядов птиц – П.Н. Амосовым.

ФАУНА СОЯНСКОГО ЗАКАЗНИКА

Фауна позвоночных животных

Класс Земноводные Amphibia

Отряд Бесхвостые земноводные Anura

Травяная лягушка *Rana temporaria*

Населяет лиственные и смешанные увлажненные леса в долинах рек и ручьев, увлажненные луга, верховые болота, берега рек, ручьев и озер. Достаточно обычна.

Остромордая лягушка *Rana arvalis*

Населяет лиственные и смешанные леса, увлажненные луга, верховые болота, берега рек, ручьев и озер. Численность невысока.

Обыкновенная, или серая жаба *Bufo bufo*

Обитает в лесах, обычна по залесенным болотом. Ведет сумеречный образ жизни. Зимует в норах. Численность ее в заказнике низкая.

Отряд Хвостатые земноводные Urodela

Сибирский углозуб *Hynobius keyserlingi*

Обитает в таежных лесах. Открытых широких пойм и верховых болот избегает. Практически всю жизнь проводят на суше, в прибрежной полосе водоема, обычно не далее 2-5 м от воды. Днем скрываются под упавшими деревьями, в пнях, под лесной подстилкой, камнями и т.п. Зимуют на суше, нередко в 50 м и более от водоема, чаще в гниющих стволах упавших деревьев, под камнями, в трещинах почвы. На икрометании собираются в небольшие лесные хорошо прогреваемые водоемы, больших рек и озер избегают. Нами не зарегистрирован, но его обитание в пределах Соянского заказника и сопредельных территориях возможно.

Класс Пресмыкающиеся Reptilia

Отряд Чешуйчатые Squamata

Подотряд Ящерицы Sauria

Прыткая ящерица *Lacerta agilis*

Населяет сухие, хорошо прогреваемые места. Нами встречены 4 особи, родившиеся в этом году длиной тела 4 – 5 см с хвостом на егерском кордоне Кепино. Окружающий кордон биотоп – сосняк лишайниковый. В заказнике очень редка. Данный вид встречен далеко на север за пределами ареала.

Живородящая ящерица *Lacerta vivipara*

Населяет лиственные и хвойные леса, где придерживается облесенных болот, зарастающих вырубков, гарей, обочин дорог, лесных опушек, полян и просек. Обычный вид.

Класс Птицы *Aves*

Отряд Гагарообразные *Gaviiformes*

Чернозобая гагара *Gavia arctica*

Перелетный вид. Обитают в чистых, не очень заросших и достаточно крупных озерах и старицах. Нами пара чернозобых гагар была обнаружена на оз. Нижнее Пачозеро и пара на оз. Турецкое. Численность чернозобых гагар в заказнике низкая.

Отряд Гусеобразные *Anseriformes*

Семейство утиные *Anatidae*

Гуменник *Anser fabalis*

В таежной зоне обитает на верховых тундроподобных болотах, таежных озерах, открытых долинах небольших рек и ручьев. Нами одна особь гуменника была встречена на р. Сояне в районе нежилого поселка Кучема. В заказнике редок.

Кряква *Anas platyrhynchos*

Населяет поймы рек от крупных до лесных речушек, побережья стоячих и слабо проточных водоемов. Встречается на оз. Турецкое, р. Сояна ниже и выше Переката.

Характер пребывания – перелетный, обычный вид.

Свиязь *Anas penelope*

Населяет поймы рек от крупных до лесных речушек, побережья стоячих и слабо проточных водоемов богатых прибрежной растительностью. Встречена в нижнем течение р. Котуги, на р. Сояна в районе Переката, на р. Кепина (нижнее течение).

Характер пребывания – перелетный, обычный вид.

Чирок-свиистунок *Anas crecca*

Гнездятся по берегам мелких лесных речек, вблизи временных луж на вырубках, полянах. Встречается в нижнем течении р. Котуги, на оз. Турецкое, на р. Сояна.

Характер пребывания – перелетный, обычный вид.

Гоголь *Vulpes clangula*

Спокойные участки таежных рек и озера с зарослями осоки и тростников и обширными плесами. Встречался часто на всем протяжении реки Котуги и по реке Сояне от начала до Ивгоры.

Характер пребывания – перелетный, обычный вид

Большой крохаль *Mergus merganser*

Характер пребывания – перелетный, обычный вид.

Местообитание – селится на быстрых с мелкими перекатами реках богатых рыбой. Отмечен на р. Сояне.

Отряд соколообразные Falconiformes

Скопа *Pandion haliaetus*

Перелетный вид. Гнездится около достаточно крупных водоемов, богатых рыбой с крупными суховершинными деревьями, удобными для устройства гнезд и не часто посещаемых людьми.

Нами охотящиеся скопы зарегистрированы около пос. Кепино, в районе места впадения в р. Сояну р. Большая Турья и около урочища Ивгора. Таким образом, на обследованном участке обитает примерно 2 – 3 пары. Нами найдены 2 гнезда скопы, находящиеся в 100 – 150 м друг от друга: одно из них нежилое (находится на старой сухой сосне), другое, возможно, иногда используется (не ежегодно) или брошено недавно. Гнезда находятся по тропе, ведущей на озеро

Турецкое (географические координаты: 65° 35, 103' с.ш.; 42° 09, 640' в.д.). Указанные гнезда находятся на высоте 18 – 20 м от земли, их диаметр составляет 90 – 120 см.

Вид занесен в Красные книги РФ и Архангельской области.

Черный коршун *Milvus migrans*

Перелетный вид. Поселяется в разных лесах, преимущественно пойменных и приречных, в окрестностях больших озер.

Нами коршун зарегистрирован у озера Ниж. Пачозеро. Гнездо не найдено. Редкий в заказнике вид. Отмечен на северном пределе распространения.

Болотный, или камышовый лунь *Circus aeruginosus*

Перелетный вид. Обитает на болотах и озерах с камышовыми и рогозовыми зарослями. Гнездо устраивает на земле среди кустов или на тростнике. Редкий вид.

Нами отмечен в районе урочища Степанов Дол около зимника, ведущего к 71 км дороги на пос. Поморье. Но данная регистрация нуждается в уточнении.

Ястреб-перепелятник *Accipiter nisus*

Перелетный вид. Обитает в различных лесах у открытых мест. Редкий вид.

Ястреб-тетеревятник *Accipiter gentiles*

Оседлый вид. Гнездится в высокоствольных сосняках и ельниках, не посещаемых людьми. Гнезда на деревьях, труднодоступны и малозаметны. Найдено гнездо, возможно тетеревятника в урочище Ивгора на лиственнице на высоте 15 м от земли. Диаметр гнезда 80 – 90 см. В заказнике редок.

Обыкновенный канюк *Buteo buteo*

Перелетный вид. Населяют лесные местообитания при близости открытых пространств – лугов и полей. Вид регистрировался во время охоты над луговинами вдоль р. Котуги и р. Сояны. Редкий вид.

Мохноногий канюк *Buteo lagopus*

Перелетный вид. В северной тайге селится вблизи редин или открытых мест – лугов, болот, гарей. Нами вид регистрировался у пос. Кепино и вдоль р. Сояны. Редок.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*

Перелетный вид. Гнездятся в местах с наличием высоких, удобных для устройства гнезд деревьев неподалеку от рек и озер, богатых рыбой. Регистрировался в заказнике вдоль р. Сояны. Гнезд не найдено. На обследованном участке обитает около 2-х пар орлана-белохвоста.

Занесен в Красные книги России и Архангельской области. Очень редкий. При беспокойстве на местах гнездования может оставить эти места. Места гнездования нуждаются в строгой охране. В гнездовой период окрестности гнезда не должны посещаться людьми.

Беркут *Aquila chrysaetos*

Оседлый вид. Но некоторые особи при недостатке добычи зимой откочевывают южнее. Обитают в глухих, непосещаемых людьми лесах. На гнездовом участке могут иметь 2 – 3 гнезда, которые используют поочередно. Нами молодой беркут был зарегистрирован около зимника 16.08. 2007 г. в районе урочища Степанов Дол. Найдены гнезда беркута на геодезической вышке (65° 20,962' с.ш.; 41° 56,951' в.д.): одно располагалось на площадке вышки на высоте 7,5 м от земли и имело диаметр 120 – 130 см, другое – на верхней площадке на высоте 15, 5 м от земли, диаметром 150 см, высота гнезда 50 см. Нижнее гнездо уже не используется, а верхнее – жилое. Оно сложено из веток лиственницы и сосны, в гнезде обнаружены зеленые ветки сосны. В гнезде присутствует сфагнум; в нем обнаружено 2 маховых пера беркута. Под гнездом и в гнезде найдены остатки молодых глухарей и куропаток.

Очень редкий вид, занесен в Красные книги РФ и Архангельской области. Нуждается в строгой охране, в гнездовой период не выносит беспокойства со стороны людей.

Чеглок *Falco subbuteo*

Перелетный вид. Гнездится в лесных местообитаниях по соседству с открытыми пространствами. Нами чеглок был зарегистрирован на верховом болоте около р. Котуги. Пара чеглоков проявляла беспокойство при виде людей. Гнездо не найдено. Редкий вид.

Дербник *Falco columbarius*

Перелетный вид. Поселяется на опушках, в редколесьях и островных лесах. Гнезд не строят, а используют старые, чаще вороны гнезда. Иногда гнездятся на земле, устраиваясь в небольшой ямке на склоне с кустарником или в траве.

Редкий вид.

Отряд Курообразные Galliformes

Семейство тетеревиные *Tetraonidae*

Тетерев *Lyrurus tetrix*

Оседлый, обычный вид.

Местообитание – чаще всего участки смешанного леса перемежающиеся с открытыми пространствами вырубками гарями, болотами и т.п.

Глухарь *Tetrao urogallus*

Местообитания боры зеленомошники и долгомошники беломошники. Наиболее многочислен по границам с болотами или иными типами растительности. Местом тока обычно служат заболоченные сосняки, реже ельники, иногда токуют на вырубке в недорубах. Одним и тем же токовищем глухари пользуются много лет. В заказнике встречен в районе д.Кепино недалеко от одноименной реки, в верхнем течении реки Сояны а правом берегу, в районе ручья Становой недалеко от Ивгоры в районе оз.Турецкого и в др.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид.

Рябчик *Tetrastes bonasia*

Наиболее характерный биотоп рябчика – глухие ельники, лога вдоль рек и ручьев, любит ольховые заросли среди елового леса.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*

Наиболее характерными местами обитания в лесной зоне для куропаток являются моховые болота, гари, вырубки, поймы рек , заросли ивняка и березы вдоль дорог и т.п. Отмечена на болоте вдоль левого берега р. Котуги, вдоль дороги от Кепино до 77 км дороги на пос. Светлый.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид.

Отряд журавлеобразные Gruiformes

Серый журавль *Grus grus*

Перелетный вид. Гнездится в различных заболоченных местностях, мало посещаемых людьми. В заказнике немногочисленен.

Отряд ржанкообразные Charadriiformes

Золотистая ржанка *Pluvialis apricaria*

Перелетный вид. Обитатель моховых болот. Избегает травянистых мест, высоких кустарников, очень сырых и очень сухих мест, участков со скудной растительностью. Численность низкая.

Малый зук *Charadrius dubius*

Перелетный вид. Обитает на песчаных и галечных отмелях на реках и озерах, на голых песчаных и каменистых пустошах. Численность низкая.

Черныш *Tringa ochropus*

Перелетный вид. Населяет небольшие лесные болота, ручьи и речки, разреженные леса с полянами и лужами. Обычный вид.

Большой улит *Tringa nebularia*

Перелетный вид. Обитает на моховых и осоковых болотах, сырых лугах, заболоченных вырубках. Обычный вид.

Фифи *Tringa glareola*

Перелетный вид. Населяет травянистые и моховые болота, берега стоячих водоемов и редколесья. Обычный вид.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*

Перелетный вид. Обитает на берегах небольших, преимущественно лесных речек. Селится по открытым травянистым берегам и голым отмелям. Отмечен нами на реках Котуга, Сояна, Нижняя Турья и озерах. Обычный вид.

Мородунка *Xenus cinereus*

Перелетный вид. Поселяется по берегам рек и озер на грязевых и песчаных отмелях. Гнездо делают на сухих местах недалеко от воды. Численность низкая.

Турухтан *Philomachus pugnax*

Перелетный вид. Обитает на мохово-травянистых или травяных болотах, луговинах. Обычны во время пролета, в гнездовой период немногочисленны.

Бекас *Gallinago gallinago*

Перелетный вид. Населяют разнообразные, преимущественно травянистые болота, сырые луга, заросшие осокой берега озер и рек. Обычный вид.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*

Перелетный вид. Обитает в густых лиственных и смешанных лесах с повышенным увлажнением с валежником и хорошим подлеском. Обычен.

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus*

Перелетный вид. Гнездится на больших вырубках и гарях и верховых болотах. Численность его невысокая.

Отряд голубеобразные *Columbiformes*

Вяхрь *Columba palumbus*

Перелетный вид. Обитает в лесах различных типов. Обычный вид.

Отряд кукушкообразные *Cuculiformes*

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus*

Перелетный вид. Обитает в сплошных лесах и открытых пространствах. Обычный вид.

Отряд совообразные *Strigiformes*

Белая сова *Nyctea scandiaca*

Оседлый и кочующий вид. Обитатель различных тундр. Зимой встречается на верховых болотах в пределах заказника. Редкий вид.

Филин *Bubo bubo*

Оседлый вид. Обитает в глухих лесах. Очень редкий. Нами не отмечен, но его обитание в заказнике возможно. Занесен в Красные книги Российской Федерации и Архангельской области.

Ястребиная сова *Surina ulula*

Оседлый вид. Живет в не очень густых хвойных и смешанных лесах. Отмечена около озера Нижнее Пачозеро. Редкий вид.

Болотная сова *Asio flammeus*

Перелетный вид. Обитатель лугов, моховых и травянистых болот (безлесных и с редкими деревьями). По численности редка.

Серая неясыть *Strix aluco*

Оседлый вид. Обитает в лесах различного типа, преимущественно в старых лиственных и смешанных. Редка.

Длиннохвостая (уральская) неясыть *Strix uralensis*

Оседлый вид. Населяет различные леса от хвойных таежных до светлых березовых. Редкий вид. Включенна в Красную книгу Архангельской области.

Бородатая неясыть *Strix nebulosa*

Оседлый вид. Обитает в старовозрастных таежных лесах с болотами, луговинами, гарями и вырубками. Очень редка. Занесена в Красную книгу Архангельской области.

Отряд стрижеобразные *Apodiformes*

Черный стриж *Apus apus*

Перелетный вид. Гнездятся колониально или отдельными парами в расщелинах скал, береговых обрывах, в лесу – в дуплах, полудуплах и других полостях. Кормятся над открытыми пространствами – лугами и болотами. Обычный вид.

Отряд дятлообразные *Piciformes*

Желна, или черный дятел *Dryocopus martius*

Оседлый вид. Обитает в старых высокоствольных хвойных и смешанных лесах. Предпочитает селиться около недавних пожарищ с больными и погибшими деревьями. Немногочисленен.

Большой пестрый дятел *Dendrocopos major*

Оседлый вид. Обитает преимущественно в хвойных и смешанных лесах. Обычен.

Малый, или малый пестрый дятел *Dendrocopos minor*

Оседлый вид. Обитает в лиственных и смешанных лесах, предпочитая пойменные и заболоченные. Дупло малого дятла найдено в районе оз. Турецкое. Численность низкая.

Трехпалый дятел *Picooides tridactylus*

Оседлый вид. Обитает в лиственничниках и других хвойных, а иногда и в смешанных лесах. Особенно предпочитает заболоченные и затопленные леса и старые пожарища. Немногочисленен.

Отряд воробьинообразные Passeriformes

Лесной конек *Anthus trivialis*

Перелетный вид. Населяют различные лесные местообитания, обычно на опушках, негустых смешанных лесах с травянистым покрытием и не очень плотным подлеском. Селятся на вырубках, где остались кусты и отдельные деревья. Занимают верховые болота с редкими соснами. Обычный, местами многочисленный вид.

Желтая трясогузка *Motacilla flava*

Перелетный вид. Обитает на лугах и травянистых болотах. В последние годы численность упала. В целом – обычный вид.

Белая трясогузка *Motacilla alba*

Перелетный вид. Гнездовые местообитания разнообразны. Обитает на вырубках, лугах. Тяготеет к воде и человеческому жилью. Обычный вид.

Свиристель *Bombus garrulus*

Оседлый, кочующий вид. Гнездовые местообитания – разнообразные хвойные и смешанные леса (еловые и сосновые), негустые с подростом. Обитает и в редких сосновых лесах по окраинам верховых болот. Обычен.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio*

Населяет кустарниковые заросли и мелколесья на опушках, вырубках, в речных долинах. На территории заказника гнездится на верховых болотах с редкими соснами. Обычный вид.

Серый, или большой сорокопут *Lanius excubitor*

Перелетный вид. Обитает в негустых лесах с полянами, опушках лесных массивов, вырубках, гарях, верховых болотах с редкими деревьями и кустарниками. Нами регистрировался в районе Черных озер в июне 2007 г. Очень редок. Включен в Красные книги Российской Федерации и Архангельской области.

Кукша *Cractes infaustus*

Оседлый вид. Наиболее свойственна темнохвойным таежным лесам, а также лиственничным. Немногочисленный вид.

Сойка *Garrulus glandarius*

Оседлый вид. Селится в лесах разных типов. Численность в заказнике низкая.

Серая ворона *Corvus cornix*

Оседлый вид. Селится в разнообразных местообитаниях с наличием деревьев, также гнездится на лугах на отдельно стоящих ивах, других высоких кустарниках и деревьях. Встречается у дорог и поблизости от человеческого жилья. В заказнике немногочисленна.

Ворон *Corvus corax*

Оседлый вид. Обитает в высокоствольных лесах разного типа, вдали от населенных пунктов. В заказнике редок.

Крапивник *Troglodytes troglodytes*

Перелетный вид. Населяет сырые пойменные и приручьевые леса с густыми ельниками и лиственными породами, густым подростом и подростом, сильно захламленных валежником и заросших кустарниками и травой. Нами отмечен во влажном березовом логу с кустарником поблизости от ручья Станового. Численность низкая.

Лесная завирушка *Prunella modularis*

Перелетный вид. Населяет густые леса с подростом, густым подростом, смешанные, лиственные, но предпочитает леса с участием ели. Немногочисленный вид.

Камышевка-барсучок *Acrocephalus schoenobaenus*

Перелетный вид. Обитает в зарослях тростника, рогоза, осоки у водоемов, предпочтительно с кустарниками и у воды. Обычный вид.

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus*

Перелетный вид. Обитатель негустых смешанных и лиственных светлых лесов, опушек и полян, лугов и травянистых болот с зарослями кустарников, ивняковых зарослях в пойме. Обычный, местами многочисленный вид.

Пеночка-теньковка *Phylloscopus collybita*

Перелетный вид. Населяет разнообразные хвойные и смешанные леса с подлеском, гнездятся в высоких ивняках. Обычный вид.

Пеночка-таловка *Phylloscopus borealis*

Перелетный вид. Обитатель негустых смешанных и лиственных лесов, полей и опушек. Обычный вид.

Садовая славка *Sylvia borin*

Перелетный вид. Обитает в пойменных кустарниковых зарослях (ивняках), смешанных и лиственных лесах, вырубках, по опушкам. Обычный вид.

Серая славка *Sylvia communis*

Перелетный вид. Гнездовые местообитания – кустарниковые заросли на луговинах у озер и речек. Обычна.

Желтоголовый королек *Regulus regulus*

Перелетный вид. Обитает в высокоствольных хвойных лесах, преимущественно ельниках. На территории заказника обычен.

Серая мухоловка *Muscicapa striata*

Перелетный вид. Населяет светлые сосновые, высокоствольные лиственные и смешанные леса. Обычна.

Луговой чекан *Saxicola rubetra*

Перелетный вид. Отмечено обитание на пойменных лугах с кустарниками и высокими жесткостебельными травами, а также на верховых кустарничковых болотах. Обычен.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*

Перелетный вид. Населяет пустыри, окраины и откосы дорог, встречается на верховых болотах. Немногочисленна.

Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus*

Перелетный вид. Обычен в негустых лесах различных типов, опушках.

Зарянка *Erithacus rubecula*

Перелетный вид. Населяют различные леса, преимущественно смешанные, сырые, захламлинные, с богатым подлеском и подростом. Обычный вид.

Варакушка *Luscinia svecica*

Перелетный вид. Занимают полуоткрытые местообитания поблизости от воды – ручьев, болотцев, канав. Обычный, но немногочисленный вид.

Рябинник *Turdus pilaris*

Перелетный вид. Гнездится обычно колониями в разнообразных местах – от густого леса до открытых мест с кустарниками. Предпочитает смешанный лес с полянами и его опушки недалеко от воды. Обычный вид.

Белобровик *Turdus iliacus*

Перелетный вид. Гнездится в смешанных лесах с хорошим подлеском, обычно по краю колонии рябинников. Обычный вид.

Певчий дрозд *Turdus philomelos*

Перелетный вид. Предпочитают леса разных типов, чаще смешанные с елями и еловым подростом. 12 августа был найден плохо летающий слеток певчего дрозда. В заказнике обычен.

Деряба *Turdus viscivorus*

Перелетный вид. Гнездятся отдельными парами в сосновых борах и высокоствольных смешанных лесах с подростом, обычно около оврага, ручья или в речной пойме. Немногочисленный вид.

Буроголовая гаичка *Parus montanus*

Оседлый вид. Живут в хвойных, смешанных и лиственных лесах, предпочитая заболоченные пойменные леса. Обычный вид.

Сероголовая гаичка *Parus cinctus*

Оседлый вид. Обитают в хвойных и смешанных лесах с подростом и подлеском, предпочитая сосняки. В заказнике – обычный вид.

Хохлатая синица *Parus cristatus*

Оседлый вид – обитатель высокоствольных сосновых и еловых лесов, в смешанных лесах поселяются редко. Дуплогнездник. Немногочисленный вид.

Зяблик *Fringilla coelebs*

Перелетный вид. Обитают в хвойных, смешанных и лиственных лесах, зарослях ив и сероольшанниках в пойме. Обычный, местами многочисленный вид.

Юрок, или выюрок *Fringilla montifringilla*

Перелетный вид. Населяют преимущественно смешанные леса. Обычный вид.

Чиж *Carduelis spinus*

Оседлый вид, частично откочевывает южнее. Живет в ельниках, реже в сосновых и смешанных лесах, обычно негустых, с полянами и прогалинами, часто рядом с поймой или долинами ручьев. Обычный вид.

Обыкновенная чечетка *Carduelis flammea*

Оседлый вид. Обитают в смешанных лесах с преобладанием хвойных деревьев, а также в высоких ивняках. Обычна.

Клест-сосновик *Loxia pytyopsittacus*

Оседлый, кочующий вид. Время и место гнездования зависит от урожая хвойных деревьев. Обитает в хвойных лесах, чаще сосновых. Обычный вид.

Клест-еловик *Loxia curvirostra*

Оседлый, кочующий вид. Время и место гнездования зависит от урожая хвойных деревьев. Обитает в хвойных лесах, чаще еловых. Обычный вид.

Снегирь *Pyrrhula pyrrhula*

Оседлый вид. Гнездится в разнообразных хвойных и смешанных лесах, чаще в негустых, с хорошим еловым подростом. Обычный вид.

Овсянка-крошка *Emberiza pusilla*

Перелетный вид. Обитает в разреженных лесах, их опушках, полянах и кустарниках. Встречается часто на верховых болотах с сосновым редколесьем. Обычный, но немногочисленный в заказнике вид.

Овсянка-ремез *Emberiza rustica*

Перелетный вид. Селится в негустых хвойных и смешанных лесах, сырых или заболоченных. Предпочитает ельники и пихтарники. Немногочисленный в заказнике вид.

Тростниковая (камышовая) овсянка *Emberiza schoeniclus*

Перелетный вид. Селятся на травянистых болотах и сырых лугах с кустарниками или редкими деревьями, по берегам рек и озер, где есть травы и

кусты, зарастающие отмели. В заказнике – чаще в ивняковых зарослях у воды. Обычный вид.

Класс Млекопитающие Mammalia

Отряд Насекомоядные Insectivora

Семейство кротовые Talpidae

Обыкновенный крот *Talpa europaea*

Местами обитания крота являются луга, лесные поляны, вырубки, участки сравнительно редкого лиственного леса. Чаще всего он поселяется недалеко от ручья, реки или озера. Выбор подобных угодий связан в первую очередь с характером питания крота. Основную пищу его составляют дождевые черви и, в меньшей степени, насекомые и их личинки.

Характер пребывания – оседлый, редкий вид.

Семейство землеройковые Soricidae

Обыкновенная бурозубка *Sorex araneus*

Предпочитает затененные, захламленные насаждения с обильным буреломом и подстилкой из опавшей листвы и хвои. Обычна в лиственных насаждениях

Характер пребывания – оседлый, обычный вид.

Отряд Зайцеобразные Lagomorpha

Семейство зайчьи Leporidae

Зяец-беляк *Lepus timidus*

Излюбленными местами обитания беляка служат участки хвойного, преимущественно елового леса, изреженного вырубками и гарями зарастающими молодняком лиственных пород. Следы пребывания в заказнике встречаются повсеместно.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид.

Отряд Грызуны Rodentia

Семейство белчицы Sciuridae

Обыкновенная белка *Sciurus vulgaris*

Типичные места обитания – спелый хвойный лес. Следы пребывания в заказнике повсеместно.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид

Бурундук *Eutamias sibiricus*

Наиболее характерные места обитания кустарниковые заросли, гари, вырубки, причем заселяет места с обильным валежом. В заказнике встречается в пойменных лесах, отмечен в районе ручья Станового.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид.

Семейство летяжьи *Pteromyidae*

Летяга *Pteromis volans*

Биотоп - березовые, осиновые и смешанные высокоствольные насаждения.

Характер пребывания – оседлый, редкий вид

Семейство бобровые *Castoridae*

Речной бобр *Castor fiber*

Бобр ведет полуводный образ жизни, поселяется семьями на водоемах с медленным течением, с берегами, заросшими лиственной древесной растительностью. В заказнике отдельные следы пребывания встречаются по берегам Сояны в верхнем течении, в частности, погрызы березы и норы на острове ниже впадения в р. Сояну р. Большая Турья, а так же в низовьях этой реки.

Характер пребывания – оседлый, редкий вид

Семейство хомяковые *Cricetidae*

Ондатра *Ondatra zibethicus*

Ондатра заселяет водоемы, богатые растительностью, избегает рек с бедной растительностью и быстро текущей водой. В заказнике не отмечена, однако может быть, так как встречается в озерах близких к светлой системе водоемов начинающейся от оз. Нижнее Пачозеро.

Водяная полевка, или водяная крыса *Arvicola terrestris*

Биотоп – поймы рек, особенно благоприятны участки с заболоченными берегами. Так же как и ондатра может встречаться в заказнике.

Рыжая полевка *Clethrionomys glareolus*

Лиственные леса, опушки, кустарниковые заросли, ивняки по берегам рек.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид

Отряд Хищные *Carnivora*

Семейство собачьи Canidae

Волк *Canis lupus*

Глухой тайги избегает. Наиболее многочисленен в открытых ландшафтах. В заказнике для этого вида благоприятные условия в виде лесов перемежающихся логами.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид

Лисица *Vulpes vulpes*

Характерные места обитания – разреженные леса, перемежающиеся с полями, лугами и долинами рек.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид

Семейство медвежьи Ursidae

Бурый медведь *Ursus arctos*

Излюбленные места обитания – таежные хвойные леса с обилием бурелома. Основные места жировок поляны среди тайги, поросшие густой и сочной травой, вблизи лесных речек и ручьев. Следы пребывания медведя в заказнике встречаются повсеместно в насаждениях вдоль рек и в местах прилегающих к логам. Встречаются и вдоль р.Котуги, Кепины, Сояны, в районе оз Турецкого, вдоль ручья Станового и в других местах.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид, а в ряде мест заказника и многочисленный.

Семейство куньи Mustelidae

Лесная куница *Martes martes*

Куница охотнее всего поселяется в перестойных участках елового леса с большим количеством дуплистых деревьев осины, валежника и бурелома. В сосновых лесах она встречается значительно реже, а в молодых насаждениях держится не постоянно. Следы пребывания отмечены в районе р.Котуги.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид

Горноста́й *Mustela erminea*

Чаще всего горноста́й держится на сравнительно открытых участках по берегам водоемов, на опушках леса, на вырубках, гарях, окраинах болот. В спелых лесах он встречается реже. Нередко живет в городах и населенных пунктах.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид

Ласка *Mustela nivalis*

Избегает сплошных лесных массивов. Часто держится в прибрежных насаждениях.

Характер пребывания – оседлый, редкий вид

Черный (лесной) хорек *Mustela putorius*

Местообитание – опушки, небольшие рощи, островные леса, поймы рек, окраины болот. В заказнике может встречаться.

Барсук *Meles meles*

Места обитания барсука разнообразны. Чаще всего он заселяет овражистые участки смешанного леса недалеко от рек и озер, охотно селится по склонам холмов, поросших смешанным лесом с примесью ольхи. Следов пребывания не встречено, однако подходящие уголья имеются.

Росомаха *Gulo gulo*

Местообитания крайне разнообразны.

Характер пребывания – кочующий, редкий вид

Европейская норка *Mustela lutreola*

Обитает в лесах вдоль лесных речек и ручьев.

Характер пребывания – оседлый вид. В заказнике может встречаться.

Выдра *Lutra lutra*

Биотоп – лесные речки с быстрым течением, с омутами и заводями, с крутыми подмытыми берегами, богатые рыбой. Следы пребывания отмечены в одном из ручьев впадающем в р. Котугу с правого берега.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид.

Семейство кошачьи *Felidae*

Рысь *Felis lynx*

Биотоп – глухие леса с заломами, зарослями подлеска.

Характер пребывания – оседлый, обычный вид.

Отряд Парнокопытные Artiodactyla

Семейство олени Cervidae

Лось Alces alces

Биотоп – леса, где есть реки, озера, болота и где есть обильный подрост лиственных пород и сосны. Следы пребывания в заказнике повсеместны и весьма многочисленны. Это «подстриженные» подрост и подлесок вдоль рек и внутри лесных массивов, многочисленные лежки и следы на земле

Характер пребывания – оседлый, обычный, чаще многочисленный вид

Северный олень Rangifer tarandus

Излюбленные места северного оленя – открытые пространства, приближающиеся по своему характеру, в какой-то мере, к тундре. Это обширные болота или боры-беломошники, водораздельные пространства с редким угнетенным подростом.

В заказнике следы пребывания отмечались в верховьях р. Шочи (притока р. Кепины).

Характер пребывания – кочующий, редкий вид